

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj Numarası :  
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

#### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
BUĞDAY	Tahıl Küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )	80 ml/da	35 gün
	Sarı Pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )	80 ml/da	35 gün
	Septorya Yaprak Lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )	80 ml/da	35 gün
	Tahıl Fide Yanıklığı, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü ( <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> )	80 ml/da	35 gün

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

#### KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ


**Buğdayda tahıl küllemesi:** İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır. İlaçlamalar yaprakların alt ve üst yüzlerinin kaplanması sağlayacak şekilde uygulanmalıdır. **Gerektiğinde uygulama 14 gün sonra tekrarlanabilir.**

30 Temmuz 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



Dr. Nesrin ÇAKIR-ARICAN  
Daire Başkanı



# AZAMAX

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU 11, 3 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

Azoxystrobin 280 g/l + Prothioconazole 120 g/l

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

**Genel Bilgi:** Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.

**Soluma:** Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.

**Yutma:** Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.

**Ciltle Temas:** Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.

**Gözlerle Temas:** Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Genel Bilgiler:** Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın. Bilinci yerinde olmayan birine ağız yoluyla asla bir şey vermeyin. Aşırı hassasiyet sorunu yaşayan insanların ürünle çalışması veya ürüne maruz kalmasına izin verilmez. Her şüphe durumunda veya semptomlar devam ederse tıbbi yardım alın.

**Soluma:** Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.

**Yutma:** Ağızı çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

**Ciltle Temas:** Cildi bol su ile yıkayın.

**Gözlerle Temas:** Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın.

**ANTİDOTE VE TEDAVİSİ:** Semptomatik olarak tedavi edin.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

**İÇİNDEKİLER:** Azoxystrobin, Prothioconazole

#### ZARARLILIK İŞARETİ



#### UYARI KELİMESİ: DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

**H302:** Yutulması halinde zararlıdır.

**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P264:** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü, sabun ve su ile iyice yıkayın.

**P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara çmeyin.

**P273:** Çevreye verilmesinden kaçınınız.

**P301+P312 - YUTULDUĞUNDA:** Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

**P330:** Ağızınızı çalkalayın.

**P391:** Döküntüleri toplayın.

**P501:** İçeriği/kabı; yerel, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası tüzüğe uygun olarak, zararlı veya özel atık toplama noktasında bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**EUH208:** 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

**UPL ZİRAAT**  
ve KİMYA SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.  
Adalet Mah. Manas Bulv. No:47B/3107  
Bayraklı/İZMİR Hasan Tahsin V.D. 206 026 4141  
Tel 0232 446 57 89-90 Faks: 0232 489 04 82  
Mersis No: 020600611400007

**Mehmet BAŞER**

Ruhsatlandırma ve  
Yeni Ürün Geliştirme Müdürü


**Buğdayda sarı pas:** Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri 1 yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15-20°C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa, **10-12 gün sonra** ilaçlama tekrarlanabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

**Buğdayda septorya yaprak lekesi:** Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden **14 gün sonra uygulama tekrarlanabilir.**

**Buğdayda tahıl fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü:** Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli hallerde ikinci ve üçüncü ilaçlamalar **14 gün** aralıklarla yapılmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** AZAMAX adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **11, 3** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **AZAMAX**'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **11, 3** harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



# AZAMAX

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	11, 3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	-------	-------------------------

Azoxystrobin 280 g/l + Prothioconazole 120 g/l

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Uygulama esnasında genel korunma tedbirlerine uyunuz.
- Yalnızca tavsiye edilen amaçlarda ve dozlarda kullanılmalıdır.

**DEPOLAMA DURUMU:** Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

#### ÜRETİCİ FİRMA:

**UPL LIMITED**

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road  
Khar (W), Mumbai- 400 052, HİNDİSTAN

#### ÜRETİM TESİSİ:

**UPL LIMITED**

Plot No 3101/02, G.I.D.C. Ankleswar  
Gujarat, 393 002 – HİNDİSTAN

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**UPL ZİRAAT VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Adalet Mah. Manas Blv. No: 47 B/3107 Bayraklı, İZMİR

Tel: +90 232 446 57 89-90

Faks: +90 232 449 04 82

**UPL ZİRAAT**  
**ve KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**  
Adalet Mah. Manas Bulv. No: 47B/3107  
Bayraklı/İZMİR Hasan Tahsin V.D. 206 026 4141  
Tel 0232 446 57 89-90 Faks: 0232 449 04 82  
Mersis No: 020602674100017

**Mehmet BAŞER**

Ruhsatlandırma ve  
Yeni Ürün Geliştirme Müdürü

30 Temmuz 2021

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KABUL EDİLMİŞTİR.**

